

ワクチン	種類	乳児期									幼児期					学童期／思春期								
		生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上	
インフルエンザ菌b型 (ヒブ)	不活化			①	②	③					④													
肺炎球菌 (PCV13)	不活化			①	②	③					④													
B型肝炎 (HBV)	ユニバーサル			①	②				③														①②③	
	母子感染予防	①	②					③																
ロタウイルス	1価			①	②																			
	5価			①	②	③																		
四種混合 (DPT-IPV)	不活化			①	②		③				④						(7.5歳まで)							
三種混合 (DPT)	不活化			①	②		③				④						(7.5歳まで)							
ポリオ (IPV)	不活化			①	②		③				④						(7.5歳まで)							
BCG	生						①																	
麻しん、風しん (MR)	生										①							②						
水痘	生										①		②											
おたふくかぜ	生										①							②						
日本脳炎	不活化													①	②	③	(7.5歳まで)			④	9-12歳			
インフルエンザ	不活化																						13歳より①	
二種混合 (DT)	不活化																					11歳①	12歳	
ヒトパピローマウイルス (HPV)	不活化																					小6	中1①②③	中2-高1

定期接種の推奨期間

任意接種の推奨期間

定期接種の接種可能な期間

任意接種の接種可能な期間

添付文書には記載されていないが、小児科学会として推奨する期間